潛伏結核感染 Q & A

一、 Q：「潛伏結核感染」與「結核病」有什麼不同？

A：「潛伏結核感染」具有以下的特性：

1. 體內有潛伏的結核菌；即結核菌在休眠期。
2. 不會有生病的感覺。
3. 不會傳染給他人。
4. 需要服要殺死體內的結核菌

而「結核病」相對於「潛伏結核感染」其特性為：

1. 體內有活動的結核菌。
2. 可能會有生病的感覺。
3. 會將結核菌傳染給他人。
4. 需要服藥至少 6 個月才可以治癒。

二、 Q：什麼是「潛伏結核感染」？

A：1.您體內有休眠期的結核菌。

2.潛伏的結核菌不會讓您覺得生病。

3.您不會將結核菌傳染給別人。

4.如果結核菌「醒來」，進入活動期並開始複製，您就開始會覺得生病，並有結核病的症狀。

三、 Q：我為什麼得到「潛伏結核感染」？

A：1.結核菌主要經由空氣傳播。

2.當傳染性肺結核的病人，在通風差的地方咳嗽、打噴嚏、唱歌、高聲談笑或吐痰時，排出含有結核菌的飛沫，被正常人吸入時發生感染。

3.服用藥物是唯一能殺死結核菌的方法。

四、 Q：但我沒有覺得生病，為什麼我需要吃藥？

A：1.結核菌即使在休眠期，仍然非常強壯。

2.休眠期的結核菌有一天會「醒來」，讓您生病並且傳染給別人。

3.要除去休眠期結核菌，治療藥物的種類比較單純，對人體的副作用比較少，所以需儘快治療。

五、 Q：如果您有潛伏結核感染，加上有以下的任何情況，您將會比別人更容易成為結核病病患。

A：1.有愛滋病毒感染。

2.有其他健康問題，例如：

(1)糖尿病控制不良

(2)營養不良或做過胃部手術

(3)矽肺病

(4)慢性腎衰竭

(5)抽菸

(6)酗酒

(7)長期使用類固醇

3.過去結核病沒有被正確的治療。

4.最近曾感染結核病。

六、 Q：潛伏結核感染的治療是什麼？

A：1.Isoniazid 亦稱為 INH，常用於治療潛伏結核感染。

2.使用 INH 進行潛伏結核感染治療通常需要持續用藥 9 個月，才能達到治療的效果。